

Ordo 4.

LITHOPHYTA. Harte Corallengewächse.

Lapis calcareus ædificatus a verme.

238. TUBIPORA. Animal - - ().
Lapis e cylindris, lamellis horizontalibus intertextis.

1. *Tubularia. Argent. t. 29.*

239. MADREPORA. Animal MEDUSA. (226).
Lapis foraminibus stellatis.

1. Madrepore. *Corall. hærb. t. 3.*
2. Alcyonium ramofo-digitatum molle asteriscis undique ornatum.
Breyn. E. N. C. VII. app. 179. Raj. syn. 3. p. 31. n. 2.
3. Adianthi aurei minimi facie planta marina. *Raj. syn. 3. p. 31. n. 4.*

240. MILLEPORA. Animal HYDRA. (221).
Lapis foraminibus teretibus.

1. Millepora arenosa anglica. *Raj. syn. 3. p. 31.*
2. Fucus telam linteum feracavve texture sua emulans.
Tournef. Inst. 568. t. 334. Raj. syn. 3. p. 42. n. 9.
3. Fucus majorius scapus albidus sanguinior compressiss., extremisibus quasi abscissis. *Morif. hist. 3. p. 646.*
f. 15. t. 8. f. 17. Raj. syn. 3. p. 43.

241. SERTULARIA. Animal NEREIS. (228).
Lapis articulatus plantiformis.

1. Corallina astaci corniculorum emula. *Raj. syn. 3. p. 34. n. 10.*
2. Corallina marina abieris forma. *Tournef. Inst. 571. Raj. syn. 3. p. 35.*
3. Corallina minus ramosa, altera vice denticulata. *Raj. syn. 3. p. 35.*
4. Corallina muscosa, denticulis bijugis unum latus spectantibus.
Pluk. alm. 119. Raj. syn. 3. p. 35. n. 14.
5. Corallina muscosa pennata, ramulis ex capillamentis falcatis.
Pluk. alm. 119. t. 47. f. 12. Raj. syn. 3. p. 36. n. 16.
6. Corallina mucosa altera vice denticulata, ramulis in cerebrima capillamenta sparsis. *Pluk. alm. 119. t. 48. f. 3. Raj. syn. 3. p. 36. n. 17.*
7. Corallina mucosa denticulata procumbens, caule tenuissimo denticulis ex adverso sitis. *Pluk. alm. 119. t. 47. f. 11. Raj. syn. 3. p. 36. n. 18.*
8. Corallina pumila repens minus ramosa. *Raj. syn. 3. p. 37. n. 19.*
9. Corallina pumila erecta ramosior. *Raj. syn. 3. p. 37. t. 2. f. 9.*

VEGE-

LITHOPHYTORUM Ordinem disposui ad methodum & doctrinam
 Celeberr. JUSSPAEI, qui haec animalcula primus & fore solus de-
 exit. *Vid. Dissert. de CORALLIIS BALTHICIS p. 8. 9.*

LINNAEUS
VEGETABILE
REGNUM

Classes XXIV habet.

I. MONANDRIA	Einnäntrige.
II. DIANDRIA	Zweymäntrige.
III. TRIANDRIA	Dreymäntrige.
IV. TETRANDRIA	Viermäntrige.
V. PENTANDRIA	Fünfmäntrige.
VI. HEXANDRIA	Sechsmäntrige.
VII. HEPTANDRIA	Siebenmäntrige.
VIII. OCTANDRIA	Achtmäntrige.
IX. ENNEANDRIA	Neunmäntrige.
X. DECANDRIA	Zehnmäntrige.
XI. DODECANDRIA	Dwölfinmäntrige.
XII. ICOSANDRIA	Dwanzigmäntrige.
XIII. POLYANDRIA	Vielmäntrige.
XIV. DIDYNAMIA	Zweymächtige.
XV. TETRADYNAMIA	Viermächtige.
XVI. MONADELPHIA	Rechte Brüder.
XVII. DIADELPHIA	Halb-Brüder.
XVIII. POLYADELPHIA	Viel Geschwister.
XIX. SYNGENESIA	Schwäger.
XX. GYNANDRIA	Weiber Männer.
XXI. MONOECIA	Einhäufigere.
XXII. DIOECIA	Zweihäufigere.
XXIII. POLYGAMIA	Vielfache Ehe.
XXIV. CRYPTOGAMIA	Heimliche Ehe.

METHODUS SEXUALIS.

VERMES ZOOPHYTA. Ibis.

Boerb. ind. pl. 2. p. 4. *Corallium geniculatum capillaceum*, apice ramoso, roseum.
Morif. hist. pl. 1. p. 657. n. 14. *Hippuris faxea fulvo-rubra Conchaternana.*
Seb. mis. 3. t. 104. f. 1. *Accabaar f. Corallodendron vulgare rubrum.*
Habitat in Oceano Indico, basi rupibus adhaerens, saturate rubra, rarissime praeter genicula spongiosa lutea, alba.

Entrocha. 4. I. stirpe testacea tereti: articulis orbiculatis perforatis, ramis verticillatis dichotomis.
Habitat in pelago, stirpe digitis crassitis, confertissime articulata ex orbiculis planis centro perforato: foramine pentagono disco utroque e centro substriato, superficie exteriori f. corticali inaequali, ordine tuberculorum cincto, (quae rumorum deciduorum cicatrices); ramis tenuibus dichotomis, continuis nec articulatis, unde Entrochi et Coralloides ejusdem speciei petrificata.

Asteria. 5. I. stirpe testacea articulata pentagona, ramis verticillatis: stella terminali dichotoma.
Edu. encrin. 1764. 4. t. 13. f. 14. *Encrinus capitestellato ramo dico dichotomo, stipite pentagono equiletiformi.*
Guettard atl. Parisi. 1761. *Palma marina e Martinica.*
Ast. angl. 52. t. 14.
Habitat in Oceano, Barbados alliente.
Ex hac derivanda frequentissime illa montium europeorum petrefacta Asteriac ditta.

coccinea. 6. I. pumila varie ramosa, ramulis divaricatis, osse articulato linearis substriato ruberrimo, internodis brevibus spongiosis fulvis, carne intus pallide rosa, extus cellulis elevatis verruciformibus coccineis: oculis minimis. *Soland. et Ellis corall. p. 107. n. 3. t. 12. f. 5.*
Habitat in Oceano Indico, 2-3 pollices alta, nitidissime coccinea, variis alba.

ANTI-

Linnæus 136
Emelius 1791

VERMES ZOOPHYTA. Antipathes,

3795

ANTIPATHES. Animal crescents plantae facie.

Stirps intus cornea spinulis exiguis obsita, basi explanata, extus carne gelatinosa, verrucis polypiferis obducta.

spiralis. 1. A. simplicissima spiralis scabra. Soland. et Ellis corall. p. 99. n. 1. t. 19. f. 1-6.

Pallas et. zooph. p. 217. n. 141. Antipathes simplicissima attenuata flexuoso-spiralis, spinulis scribatis scabra.

Syst. nat. XII. 2. p. 1290. n. 4. 8. Gorgonia spiralis.

C. Baub. pin. p. 366. Corallina nigra setacea circumvoluta;

Pon. bald. ital. p. 230. Antipathis vel Corallinae quarta species.

Tournef. inst. p. 574. Lithophyton nigrum setaceum circumvolutum.

Rumpf amb. 6. p. 202. t. 78. C. Palmjuncus anguinus.

Valentyne ind. 3. t. 52. f. BB. Tali-atros f. funis aquatilis.

Ephem. Ac. Caef. Nat. Cur. Dec. 2. A. 3. p. 78. t. 4. f. 4.

Habitat in mari Indico, mediterraneo, norwegico, atra, rigidissima, fragilis, longissima, calami scriptorii crassitiae.

Ulex. 2. A. ramosissima ramis sparsis patentibus hispidissimis attenuatis. Soland. et Ellis corall. p. 100. n. 2. t. 19. f. 7. 8.

Habitat in mari Indico, ramis tuberculis ovatis cavis ex fuscescente luteis sparsis, cornuum ad instar nunc sursum nunc ad latera, nunc deorsum versis, an ovariu? obsestit.

subpinnata. 3. A. ramosa pianata hispida, pinnulis setaceis alternis, aliis ratiocibus transversim excurrentibus. Soland. et Ellis corall. p. 101. n. 3. t. 19. f. 9. 10.

Habitat in mari mediterraneo, cinerea, spinulis succinatis.

myriophylla. 4. A. incurva ramosissima pinnata, pinnulis hinc ramosis setaceis. Soland. et Ellis corall. p. 102. n. 4. t. 19. f. 11. 12.

Pallas et. zooph. p. 210. n. 135. Antipathes incurva ramosissima pinnataque, ramis sparsis divaricatis, pinnulis ratiocibus setaceis, hinc ramosis.

Clyt. exos. 1. 6. c. 5? Ericas facio frutex marinus.

Petiv. gaz. 1. 35. f. 12. Myriophyllum indicum ramosissimum.

Breyn prodr. 2. p. 35. ic. p. 33. t. 29. Lithophyton fuscum subtilissimum ramis tenuissime divisis et subdivisis.

Rumpf amb. 6. p. 209. Erica marina tenuis.

LII LIII LIV L V

Habitat

Habitat in Oceano indico, et mari mediterraneo, interdum sesquipedalis, asperima ex flavicante fusca, lepades testaeasque affixa, sibi saepius habens.

elopecu- 5. A. ramosa, ramis arte paniculatis hispidis setaceis. *Solan-*
roides. *et Ellis corall. p. 102. n. 5.*

Habitat ad Carolinas septentrionalis littora, ad 2 fere pedes alta, grisea, intus splendens, nigra, basi dilatata, ramis altero latere explanatis, sulco medio exaratis.

Cupref- 6. A. simplex scabra paniculata, ramis recurvatis. *Soland, et*
fus. *Ellis corall. p. 103. n. 6.*

Pallas el. zooph. p. 213. n. 138. Antipathes (cupressina) trunco simplici longissimo flexuoso ramulis confertis recurvis ramosissimis paniculatis.

Syst. nat. XII. 2. p. 1290. n. 4. a. Gorgonia (Abies recta) simplex scabra paniculata, ramis recurvatis.

Syst. nat. X. n. 7. Gorgonia (aenea) paniculata, ramis muriceo-scabris.

Rumpf amb. 6. p. 207. t. 80. f. 2. Cupressus marina.

Seb. mus. 3. t. 106. f. 1.

Habitat in Oceano indico, ad 2 usque pedes longa, trunco pennae cygnae crassitie, tomento griseo hispida, intus aterrima.

orichal- 7. A. aenea laevis, trunco simplici rigidissimo ramis spiraliter
cea. sparsis dichotomis paniculato. *Pallas el. zooph. p. 215.*
n. 139.

Syst. nat. XII. 2. p. 1290. n. 5. Gorgonia (aenea) panicu-
lata, culmo flexuoso, ramis alternis confertis dichotomis.

Rumpf amb. 6. p. 227. t. 80. f. 2.

Seb. mus. 3. t. 100. f. 17-19.

Valentyn ind. 3. 2. p. 545. col. I.

Habitat in Oceano indico, subpedalit, rigidissima, rarior.

dichoto- 8. A. longissima dichotoma erecta. *Pallas el. zooph. p. 216.*
ma. *n. 140.*

Marf. hist. mar. p. 105. t. 21, 22. f. 101. et p. 68. t. 46.
f. 179. n. 1. 2.

Habitat in mari mediterraneo, ad 2 usque pedes alta, teres,
obscura.

clathrata. 9. A. ramosissima intricata, ramulis confusis ubique coalescen-
tibus: junioribus setaceis. *Pallas el. zooph. p. 212. n. 137.*
Hort. Cliff. p. 479. n. 2. His flexilis fruticosa, caule subdi-
viso, ramulis setaceis strictis undique prominentibus.

Bocce.

Bocce. mus. p. 259. t. 9. Antipathes spinosa exilis reticulata
arborea indica, aut Antipathes exilis alpaloides.

Moris. hist. pl. 3. p. 652. f. 15. t. 10. n. 18. Fruticulus ma-
rinus asperiusculus, ramulis ferulaceis spinulis excentribus.

Habitat in Oceano indico, lepadibus et milleporis facie ob-
seja, semipedalis vel pedalis, intus atra.

Flabel- 10. A. explanata ramosissima subdivisa, ramulis bifariam ra-

lum. mosis reticulatum cohaerentibus. *Pallas el. zooph. p. 111.*
n. 136.

Rumpf amb. 6. p. 209. Ericae marinae affinis.

Habitat in Oceano indico, undulato curvata, semipedalis
fere diametri, atra, tenerima scabritie bispida.

Pennacea. 11. A. ramosa subincurva, ramis pinnatis: pinnulis setaceis cro-

bertimis hispidis. *Pallas el. zooph. p. 209. n. 134.*

Rumpf amb. 6. p. 209. Accabaar rutturutu f. Erica mari-
na erasta.

Aldrov. mus. met. p. 848. ic. I. Peucites prisnia.

Habitat in Oceano indico, griseo-scabra, invaginata, pedem
fere alta, truncis pedem crassitie aequanti.

ericoides. 12. A. ramosissima hispidissima astra, ramis sparsis, ramulis

ubique crebris subulatis. *Pallas el. zooph. p. 208. n. 133.*

Rumpf amb. 6. p. 207. Cupressus marina prior.

Habitat in Oceano indico, circiter pedalis, aterrima.

foenicula- 13. A. ramosissima, ramis setaceis decomposito pinnatis. *Pal-*
cea. *los el. zooph. p. 207. n. 132.*

Rumpf amb. 6. p. 208. t. 80. f. 3. Foenum marinum.

Habitat in mari mediterraneo, pedem saepius excedens, atra.