

QL  
375  
P16  
1766  
Inv. Zool.  
S. P A L L A S //

MEDICINA DOCTORIS

Academ. Caesareae & Societ. Reg. Angliae Sedent.

ELENCHUS /

ZOOPHYTICORUM //

S I S T E N S

GENERALUM ADUMBRATIONES GENERALIO-  
RES ET SPECIERUM COGNITARUM  
SUCCINCTAS DESCRIPTIONES

C U M A. 1765

SELECTIS AUCTORUM SYNONYMIS

*En tibi marini nusquam aquaria  
ner non tota quae sita probra  
Et vix ex iulis evulsa corallio faxit.*

SABAZIUS



HAGAE-COMITUSS,

Apud PETRUM VARECLERI

M. D C C. L X F. L.

## VIII. ANTIPATHES.

## DEFINITIO.

*ANIMAL vegetans:*

*Stirps cornea, extus scabra, attenuata;*  
*basi explanata; obducta*

*Cortice gelatinoso, florescente*

*Polypis tentaculatis.*

*Ovaria, calyces cornæ surpi insidentes;*  
*subturbanati.*

**A**NTIPATHEN, quod appropriato utcunque *Antipathis* incerto nomine appellare visum est, genus *this at-*  
*cum Gorgoniis* autores hucusque omnes conlude- que *Gor-*  
*runt.* Et superficiarie, in *Muscis*, istius spe- *gonie af-*  
*cies contemplanti, alterius generis cortice forte*  
*orbata specimina facile videri possent. Diver-*  
*sissime tamen naturæ esse attentiore perquilitio-*  
*ne discimus.*

Natura crescendique modo *Antipathis*. Genus  
 summopere *Gorgonie* affine est. Simili nempe basi  
 explanata rupibus insidet; similiter truncum in ra-  
 mos sensim subdivisum & attenuatum; universam  
 que stirpem simul, in omnem dimensionem, cre-  
 scere testificantem exhibit; substantia, ut *Gor-*  
*gonie*, est cornea, lamellosa, sed in lamellas &  
 libras ob rigiditatem ægrius separabili; tandem-  
 que, carundem adinstar, in mari, cortice nutritivo ac florescente obductum invenitur.

Porro, prorsus eodem modo, contigua qua- vis

vis corpora crusta cornea obducit *Antipathes*, & contigui ejus rami facile coalescant, ut in plurimis *Gorgoniis* quoque fieri videmus.

*A Gorgos* At differunt insigniter *Antipathis* species omnes, primum quod *Ligi* extnum habitum: quod non, ut in *Gorgoniis* leve aut substriatum, sed tenerrima crebraque scabritie constanter hispidum est. Spinulae scabritiem constituentes per series digestas saepe sunt, inque antiquis plurium specierum truncis, obsolescent inque tomenti quandam speciem degenerant; extremis vero, fetaceos ramulos largiori hirsutie exasperant.

Idem deinde *Lignum* generaliter multo, quam in plerisque *Gorgoniis*, densius est; rigidius, fragilissimaque & quasi vitreæ nature.

*Cortex* *Cortex* autem, quo *Antipathes* vivit, non calcaneus est; sed gelatinosum tegumentum, in extremitatibus ramis crassius, inque polypos efflorescens. Hoc quidem cortice, utpote putrescibili, in Museis adservata specimina fere semper orbata videntur; verum ex observatis *Marsiliianis*, *Rumphianisque* & ex inventis a meipso, in siccis quibusdam speciminiis, mucosæ crustæ reliquis, omnibus novi nostri Generis speciebus naturalem essentialeme esse satis constat. Ex dictis porro liquet, in junioribus ramulis eundem crassiorrem esse, in antiquioribus truncis vero obsolescere.

*Ovaria s. calyces.* Notatu dignissimum est & ad similitatem inter *Antipathes* & *Sertularias* quandam constitutere videtur, quod istæ, sicut harum pleræque, *calyces* singulares, propagationi aut seminificationi verosimilime destinatos, in trunco ramisque proferant. Notabilia haecce *Antipathum* organa in plerisque enumerandarum specierum, plurimis perlustratis speciminiis, detexi. Sunt *calyculi* turbinato-cylind-

*lindracei*, varie incurvati, e subflantia cornea stirpis orti, eideoque continui. Crastinacula eorum ad stirpem subflantia in tenuissimam limbi lamellam extenuatur.

Hos *Antipathum* proprium & naturale organum esse, non heterogeneas animalculorum adventiorum cellulas, testatur diversa eorum in diversis speciebus & constans figura ac magnitudo: docet numerositas atque intima eorum, cum subflantia stirpis, evidentissimaque continuitas.

Species hujusce generis in Museis, quamvis integumento suo animali, gelatinoso plerumque distitutas, quilibet facile ex superstitis ligni eleganti hispiditate dignoscet. In planum crescenti lex, cui Gorgonae pleraque adstrictae sunt, in harum paucissimis locum habet.

### 132. ANTIPATHES FOENICULACEA.

ANTIPATHES ramosissima, ramis setaccis decomposito pinnatis.

\*Rumph. amb. VI. p. 208. tab. 80. f. 3. Foenum marinum.

#### DESCRIPTIO.

*Frutex* pedali sc̄epe major, in latum expansus, diffusus, tenuicaulis. *Truncus* in maximis calamo non crassior, ramosissimus, subdivisus. *Rami* inordinati, creberrimi, fere distichi, patentes, rigentesque, setacci; *setis* distichis, fine ordine alternis vel suboppositis, aliquando ramosis pinnati. *Lignum* fruticis, ubi opacum, atrum, extus tenerime hispidum. Rami aliqui infraeti quasi,

quasi, cum contiguisque coaliti. *Tegumentum mucosum*, setaceis maxime ramis crassissimum, ex altero fruticis latere in nodulos per intervalla collectum, siccatumque ramulos nodosos sistens. *Ovaria* rara observavi, subaxillaria, sparsave, brevia, cylindracea.

Trunci hujus speciei in *Muscis* saepius occurunt, nodosissimi, ramo vix uno alteroye pinnato superstite; rarius integra specimina. E nodo suo muco plerumque superstite, siccato quamvis, speciem facile agnoscet quivis. — Apud Antedores ejus neque iconem, neque mentionem uliibi factam invenio; nisi forte *Rumphii* Foenum marinum eo referre vellis, quod mihi saltem luc pertinere visum est.

*Locus*: Mare Mediterraneum.

### 133. ANTIPATHES ERICOIDES.

ANTIPATHES ramosissima hispidissima atra, ramis sparsis, ramulis ubique crebris subulatis.

*Rumph. amb. VI. p. 207.* Cupressis marina prior.

#### DESCRIPTIO.

*Stips* pedalis circiter, incompta, horrida s. spinosissima, aterrima, in latitudinem expansa, ramosissima. *Rami* sparsi, inaequales, oppositi, patentib. subrectanguli, attenuati, subdivisi asperisque setis item patentibus brevibus, plerisque distichis, multis & ramescentibus. *Lignum* ubique aterrima scabritie hispidissimum, opacum, fra-

fragile. *Calycos* in specimine descripto, quod Celeberr. Dn. H. D. GAUBIUS in ditissimo *Museo* servat, nulli extant. Neque in alio specimine quod Celeberr. GRONOVII *Museum* continet observantur.

*Locus*: Oceanus Indicus.

### 134. ANTIPATHES PENNACEA.

ANTIPATHES ramosa subincurva, ramis pennatis, pinnulis setaceis creberrimis hispidis.

\*Aldrov. mus. metall. p. 848. ic. 1. Peuchtes prima.

Rumph. amb. VI. p. 209. Accabaar rutturuttu f. Erica marina crassa.

### DESCRIP T I O.

E *basi* crustacea atra, extus gryseo-scabra, *trunci* plures, calami fere crassitie, rigiduli, omnesque in unum clementer curvati latus, pedali fere altitudine, inaequaliter bifarium ramei. *Trunci* *ramique* assurgentibus ubique tomento gryseo hispido, distiche pennati: *pinnulis* creberrimis, setaceis; simplicibus, parallelis, flexilibus, undique hirsutis, in latus ramorum concavum leviter inclinatis. *Lignum*, abrasa lanuginosa crasta, aterrimum est, fragileque. — Specimen meum purissimum est, nec *Balanis* constitutum.

*Locus*: Oceanus Indicus.

## NOTE.

Elegantissima simul atque rarissima hæc Antipathis species est. De *Allovvandino* synonymo dubitandi locus est. *Rumphius* autem (l. c.) certissime hanc speciem voluit, ubi stirpem ramosiorum *Erica sua marina tenui*, ramis etiam asperis, verum longioribus, plumaceis, *Muscum rutturatu referentibus*, describit. Dataam vero hujus Musci iconem specimen meum, ramorum pennaceo habitu, valde assimilatur. — Addit *Rumphius*, nigrioren sieri siccatione, durioremque; & mari enim extractam mucō copiosiori, quam *Erica tenuis*, obductam esse, coque urticante seu pruriunt ciente; prout mucus *Feni marini Rumphiani*, quod, quoniam referam, nescio.

## 135. ANTIPATHES MYRIOPHYLLA.

ANTIPATHES incurva ramosissima pinnulataque, ramis sparsis divaricatis, pinnulis rariusculis setaceis, hinc ramosis.

*Clus. exot. l. 6. c. 5.* *Ericæ facie frutex marinus.*  
*Petiv. gaz. tab. 35. f. 12.* *Myriophyllum Indicum ramosissimum,*

*Breyn. prodr. II. p. 35.* *Icon. p. 33. tab. 29.*  
*Lithophytum luscum, subhirsutum, ramis tenueissime divisis & subdivisis.*

*Rumph. amb. VI. p. 209.* *Erica marina tenuis.*

## DESCRIPTION.

*Fruticulus ad summum subsesquipedalis, asperitus, inordinatus, varie incurvatus. Caules e basi*